



## CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ

8200 Veszprém, Kórház u. 1.

Kódszám: SZN/013.2

### BETEGTÁJÉKOZTATÓ

#### túlhordásról, koraszülésről, szülésinductoról, császármetszésről

##### **Koraszülés**

A terhesség betöltött 24-37. hete között beszélünk koraszülésről. Felvételt követően célunk a fájások leállítása, a terhesség kiviselésének biztosítása. A 34. hét előtt „tüdőérlelő” injekciót adunk, és próbáljuk legalább 24 óráig tartani a terhességet, míg a gyógyszer kifejti hatását. Görcsök esetén – szülőszobai ellenőrzés mellett – infúziók, antibiotikumok, injekciók segítségével igyekszünk leállítani a koraszülést. Elfolyt magzatvíz miatt megindult koraszülésnél, a 24-48 óra kivárása után döntünk a szülés befejezésének módjáról, természetesen az Ön egyetértésével. Vérzés esetén annak mértéke dönti el a befejezés módját. Ha a koraszülés nem állítható le, vagy felvételekor már olyan előrehaladott állapotban van, hogy nincs lehetőség leállítani, akkor engedjük azt lezajlani. A szakma szabályai szerint vezetjük a koraszülést. A magzat megszületésekor mindig jelen van gyermekorvos is. A 2300 gr alatti koraszülöttek - a szülőszobai ellátás után – az intenzív újszülött osztályra kerülnek. Önnel a további ellátás ugyanúgy történik, mint érett szülés esetében.

##### **Túlhordás**

Ha a 40. terhességi hét betöltéséig a szülés nem zajlik le, akkor – elsősorban a magzat érdekében – fokozott ellenőrzés szükséges: 41. hétig 2 naponta CTG vizsgálatot, valamint ultrahanggal a magzati keringés ellenőrzését végezzük várandós ambulanciánkon. A 41. hét betöltésekor szülésindítást végzünk, melynek módját a méhszáj érettsége alapján döntjük el.

##### **Szülésinductio**

A 41. hét betöltésekor, vagy ha az Ön, illetve a magzat állapota a terhesség 37. hete után indokolja, szülésindítást végzünk, melynek módját a méhszáj érettsége alapján döntjük el. Ha a méhszáj, illetve a magzat koponyájának helyzete kedvező, akkor burkot repesztünk, és – ha szükséges – Oxytocinos infúzió segítségével fájást keltünk. Ha a méhszáj éretlen- vagy nem alkalmas burkorepesztés elvégzésére, akkor méhszájérlelést kezdünk. Méhszájérlelő tablettát helyezünk a hüvelybe, amit szükség esetén 24 óra múlva ismételünk meg. Amennyiben a



## CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ

### BETEGTÁJÉKOZTATÓ

szülés ekkor sem indul meg, Oxytocinos infúzióval fájáskeltést alkalmazunk. Ha a szülés ennek ellenére sem indul meg, vagy a vajúdás üteme nem megfelelő, akkor császármetszést végzünk. Azonban hozzá kell tennünk, hogy előfordul olyan is, hogy a szülés ugyan megindul, de ennek lezajlása során olyan probléma léphet fel, amely miatt ugyancsak császármetszést kell végezni.

#### **Császármetszés**

Abban az esetben, ha az Ön vagy a magzat állapota indokolja, császármetszést végzünk. Természetesen ennek szükségességéről Ön részletes felvilágosítást kap. Ha Ön a műtéti megoldást elfogadja, akkor infúziót adunk, állandó katétert helyezünk fel, majd gerincérzéstelenítésben elvégezzük a császármetszést. A műtét után infúziók folyamatos adásával a gyermekágyas osztály őrzőszobájába kerül megfigyelésre. Ellenőrizzük a vérnyomást, a pulzust, a vérzés erősségét, a méh összehúzódását, a vizelet mennyiségét. Fájdalomcsillapítókat, méhösszehúzókat folyamatosan adunk. Hat óra elteltével az infúziót leállítjuk, az állandó katétert eltávolítjuk, osztályos rooming-in szobába helyezük át.

**Csolnok Ferenc Kórház**  
**Szülészeti-Nőgyógyászati Osztálya**